

がん種	レジメンコード	レジメン名称	一般名(一部商品名)	用量	投与日	1コース期間	備考
食道癌	1-010-0/1 01-0	術前FP療法 5-FU(800)+CDDP(80) (3週間毎)	シスプラチン(CDDP) 5-FU	80mg/m ² 800mg/m ²	d1 d1-5	21TD	術前補助化学療法(2コース) DAY0よりハイドレーション
食道癌	1-010-0/1 02-0	FP療法 5-FU(800)+CDDP(80) (4週間毎)	シスプラチン(CDDP) 5-FU	80mg/m ² 800mg/m ²	d1 d1-5	28TD	RT併用なし DAY0よりハイドレーション
食道癌	1-010-0/1 03-0	5-FU(800)+CDGP(90)	ネダプラチン(CDGP) 5-FU	90mg/m ² 800mg/m ²	d1 d1-5	28TD	RT併用なし
食道癌	1-010-0/1 04-0	DTX(70) (tri-weekly)	ドセタキセル(DTX)	70mg/m ²	d1	21TD	
食道癌	1-010-0/1 05-0	weekly PTX(100) (7週間毎、6投1休)	パクリタキセル(PTX)	100mg/m ²	d1,8,15, d22,29,36	49TD	7週間毎、6投1休
食道癌	1-010-0/1 07-0	FP+RT療法 5-FU(700)+CDDP(70)+RT (4週間毎)	シスプラチン(CDDP) 5-FU	70mg/m ² 700mg/m ²	d1 d1-4	28TD	RT併用あり、2コース DAY0よりハイドレーション
食道癌	1-010-0/1 08-0	5-FU(800)+CDGP(90)	ネダプラチン(CDGP) 5-FU	90mg/m ² 800mg/m ²	d1 d1-4	28TD	RT併用あり (臨床試験では5-FU:DAY5まで)
食道癌	1-010-0/1 09-0	Nivolumab(240mg/body) (オブジーボ療法)	ニボルマブ	240mg	d1	14TD	
がん種	レジメンコード	レジメン名称	一般名(一部商品名)	用量	投与日	1コース期間	備考
胃癌	1-020-0/1 01-0	CPT-11(100) (3投1休)	イリノテカン(CPT-11)	100mg/m ²	d1,8,15	28TD	
胃癌	1-020-0/1 02-0	CPT-11(150) (bi-weekly)	イリノテカン(CPT-11)	150mg/m ²	d1	14TD	
胃癌	1-020-0/1 03-0	DTX(60) (tri-weekly)	ドセタキセル(DTX)	60mg/m ²	d1	21TD	
胃癌	1-020-0/1 04-0	nab-PTX(260) (tri-weekly)	アブラキサン(nab-PTX)	260mg/m ²	d1	21TD	
胃癌	1-020-0/1 05-0	PTX(80) weekly (3投1休)	パクリタキセル(PTX)	80mg/m ²	d1,8,15	28TD	
胃癌	1-020-0/1 06-0	S-1+CDDP(60) (SP療法)	シスプラチン(CDDP) S-1	60mg/m ² 80-120mg	d8 d1-21	35TD	CDDPはDAY8、DAY7ハイドレーション S-1:2週間休薬
胃癌	1-020-0/1 07-0	【初回】S-1+CDDP(60)+HER(8) (SP+HER療法)	トラスツズマブ(HER) シスプラチン(CDDP) S-1	8mg/kg 60mg/m ² 80-120mg	d1 d1 d1-14	21TD	HER初回用 DAY0よりハイドレーション S-1:1週間休薬
胃癌	1-020-0/1 08-0	【2回目以降】S-1+CDDP(60)+HER(6) (SP+HER療法)	トラスツズマブ(HER) シスプラチン(CDDP) S-1	6mg/kg 60mg/m ² 80-120mg	d1 d1 d1-14	21TD	HER2回目以降降用 DAY0よりハイドレーション S-1:1週間休薬
胃癌	1-020-0/1 09-0	S-1+CPT-11(125) (IRIS療法)	イリノテカン(CPT-11) S-1	125mg/m ² 80-120mg	d1,15 d1-14	28TD	S-1:2週間休薬
胃癌	1-020-0/1 10-0	S-1+DTX(40)	ドセタキセル(DTX) S-1	40mg/m ² 80-120mg	d1 d1-14	21TD	adj:DTX2-7コース目 adj:S-1 8コース目以降28/14休
胃癌	1-020-0/1 011-0	S-1+L-OHP(100) (SOX療法)	オキサリプラチン(L-OHP) S-1	100mg/m ² 80-120mg	d1 d1-14	21TD	
胃癌	1-020-0/1 12-0	【初回】カペシタビン+CDDP(80)+HER(8)(XP+HER療法)	トラスツズマブ(HER) シスプラチン(CDDP) カペシタビン	8mg/kg 80mg/m ² 2000mg/m ²	d1 d1 d1-14	21TD	DAY0よりハイドレーション

胃癌	1-020-0/1 13-0	【2回目以降】カペシタビン+CDDP(80)+HER(6) (XP+HER療法)	トラスツズマブ(HER) シスプラチン(CDDP) カペシタビン	6mg/kg 80mg/m ² 2000mg/m ²	d1 d1 d1-14	21TD	DAY0よりハイドレーション
胃癌	1-020-0/1 14-0	ラムシルマブ(8mg/kg)+PTX(80)	ラムシルマブ(RAM) パクリタキセル(PTX)	8mg/kg 80mg/m ²	d1,15 d1,8,15	28TD	
胃癌	1-020-0/1 15-0	ラムシルマブ(8mg/kg) 単独療法	ラムシルマブ(RAM)	8mg/kg	d1	14TD	
胃癌	1-020-0/1 16-0	XELOX (カペシタビン+L-OHP(130))	オキサリプラチン(L-OHP) カペシタビン	130mg/m ² 2000mg/m ²	d1 d1-14	21TD	
胃癌	1-020-0/1 17-0	【初回】XELOX(カペシタビン+L-OHP(130))+HER(8)	トラスツズマブ(HER) オキサリプラチン(L-OHP) カペシタビン	8mg/kg 130mg/m ² 2000mg/m ²	d1 d1 d1-14	21TD	
胃癌	1-020-0/1 18-0	【2回目以降】XELOX(カペシタビン+L-OHP(130))+HER(6)	トラスツズマブ(HER) オキサリプラチン(L-OHP) カペシタビン	6mg/kg 130mg/m ² 2000mg/m ²	d1 d1 d1-14	21TD	
胃癌	1-020-1 19-0	mFOLFOX6	オキサリプラチン(L-OHP) 5-FU 5-FU	85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	d1 d1 d1(46h)	14TD	CVポートのみ
胃癌	1-020-0/1 20-0	【臨床試験】5-FU(600)+I-LV(250) (RPMI療法)	5-FU	600mg/m ²	d1,8,15 d,22,29,36	56TD	臨床試験用レジメン 5-FU:ボース投与
胃癌	1-020-0/1 21-0	【初回】SOX+HER (S-1+L-OHP(100)+HER(8))	トラスツズマブ(HER) オキサリプラチン(L-OHP) S-1	8mg/kg 100mg/m ² 80-120mg	d1 d1 d1-14	21TD	
胃癌	1-020-0/1 22-0	【2回目以降】SOX+HER (S-1+L-OHP(100)+HER(6))	トラスツズマブ(HER) オキサリプラチン(L-OHP) S-1	6mg/kg 100mg/m ² 80-120mg	d1 d1 d1-14	21TD	
胃癌	1-020-0/1 23-0	Nivolumab(240mg/body) (オプジーボ療法)	ニボルマブ	240mg	d1	14TD	3rd line以降
胃癌	1-020-0/1 24-0	nab-PTX(100) (3投1休)	アブラキサン(nab-PTX)	100mg/m ²	d1,8,15	28TD	
胃癌	1-020-0/1 25-0	カペシタビン+CDDP(80) (XP療法)	シスプラチン(CDDP) カペシタビン	80mg/m ² 2000mg/m ²	d1 d1-14	21TD	DAY0よりハイドレーション
胃癌	1-020-0/1 13-0	ラムシルマブ(8mg/kg)+nab-PTX(100)	ラムシルマブ(RAM) アブラキサン(nab-PTX)	8mg/kg 100mg/m ²	d1,15 d1,8,15	28TD	
がん種	レジメンコード	レジメン名称	一般名(一部商品名)	用量	投与日	1コース期間	備考
大腸癌	1-030-0/1 01-0	【初回】Cmab(400)+CPT-11(150)	セツキシマブ(Cmab) イリノテカン(CPT-11)	400mg/m ² 150mg/m ²	d1,8 d1	14TD	
大腸癌	1-030-0/1 02-0	【2回目以降】Cmab(250)+CPT-11(150)	セツキシマブ(Cmab) イリノテカン(CPT-11)	250mg/m ² 150mg/m ²	d1,8 d1	14TD	
大腸癌	1-030-0/1 03-0	CPT-11(150) (bi-weekly)	イリノテカン(CPT-11)	150mg/m ²	d1	14TD	
大腸癌	1-030-1 04-0	FOLFIRI	イリノテカン(CPT-11) 5-FU 5-FU	150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	d1 d1 d1(46h)	14TD	CVポートのみ

大腸癌	1-030-1 05-0	FOLFIRI 生食(5%G不使用)	イリノテカン(CPT-11) 5-FU 5-FU	150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	d1 d1 d1(46h)	14TD	CVポートのみ 生食を用いて希釈
大腸癌	1-030-1 06-0	FOLFIRI+BV(5)	ペバシズマブ(BV) イリノテカン(CPT-11) 5-FU 5-FU	5mg/kg 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	d1 d1 d1 d1(46h)	14TD	CVポートのみ
大腸癌	1-030-1 07-0	FOLFIRI+BV(5) 生食(5%G不使用)	ペバシズマブ(BV) イリノテカン(CPT-11) 5-FU 5-FU	5mg/kg 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	d1 d1 d1 d1(46h)	14TD	CVポートのみ 生食を用いて希釈
大腸癌	1-030-1 08-0	【初回】FOLFIRI+隔週Cmab(400)	セツキシマブ(Cmab) イリノテカン(CPT-11) 5-FU 5-FU	400mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	d1 d1 d1 d1(46h)	14TD	CVポートのみ
大腸癌	1-030-1 09-0	【2回目以降】FOLFIRI+隔週Cmab(250)	セツキシマブ(Cmab) イリノテカン(CPT-11) 5-FU 5-FU	250mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	d1 d1 d1 d1(46h)	14TD	CVポートのみ
大腸癌	1-030-1 10-0	FOLFIRI+Pmab(6mg/kg)	パニツムマブ(Pmab) イリノテカン(CPT-11) 5-FU 5-FU	6mg/kg 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	d1 d1 d1 d1(46h)	14TD	CVポートのみ
大腸癌	1-030-1 11-0	FOLFIRI+Pmab(6) 生食(5%G不使用)	パニツムマブ(Pmab) イリノテカン(CPT-11) 5-FU 5-FU	6mg/kg 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	d1 d1 d1 d1(46h)	14TD	CVポートのみ
大腸癌	1-030-1 12-0	mFOLFOX6	オキサリプラチン(L-OHP) 5-FU 5-FU	85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	d1 d1 d1(46h)	14TD	CVポートのみ adj: 12コース
大腸癌	1-030-1 13-0	mFOLFOX6+BV(5)	ペバシズマブ(BV) オキサリプラチン(L-OHP) 5-FU 5-FU	5mg/kg 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	d1 d1 d1 d1(46h)	14TD	CVポートのみ
大腸癌	1-030-1 14-0	mFOLFOX6+Pmab(6)	パニツムマブ(Pmab) オキサリプラチン(L-OHP) 5-FU 5-FU	6mg/kg 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	d1 d1 d1 d1(46h)	14TD	CVポートのみ
大腸癌	1-030-0/1 15-0	S-1+CPT-11(125) (IRIS療法)	イリノテカン(CPT-11) S-1	125mg/m ² 80-120mg	d1,15 d1-14	28TD	S-1:2週間休薬
大腸癌	1-030-0/1 16-0	SOX+BV (S-1+L-OHP(100)+BV(7.5))	ペバシズマブ(BV) オキサリプラチン(L-OHP) S-1	7.5mg/kg 130mg/m ² 80-120mg	d1 d1 d1-14	21TD	

大腸癌	1-030-0/1 17-0	XELOX (カペシタビン+L-OHP(130))	オキサリプラチン(L-OHP) カペシタビン	130mg/m ² 2000mg/m ²	d1 d1-14	21TD	adj:8コース
大腸癌	1-030-0/1 18-0	XELOX+BV (カペシタビン+L-OHP(130)+BV(7.5))	ベバシズマブ(BV) オキサリプラチン(L-OHP) カペシタビン	7.5mg/kg 130mg/m ² 2000mg/m ²	d1 d1 d1-14	21TD	
大腸癌	1-030-0/1 19-0	カペシタビン+BV (カペシタビン+BV(7.5))	ベバシズマブ(BV) カペシタビン	7.5mg/kg 2000mg/m ²	d1 d1-14	21TD	
大腸癌	1-030-0/1 20-0	S-1+CPT-11(100)+BV(5) (IRIS+BV療法)	ベバシズマブ(BV) イリノテカン(CPT-11) S-1	5mg/kg 100mg/m ² 80-120mg	d1,15 d1,15 d1-14	28TD	S-1:2週間休薬
大腸癌	1-030-1 21-0	ラムシルマブ(8)+FOLFIRI	ラムシルマブ(RAM) オキサリプラチン(L-OHP) 5-FU 5-FU	8mg/kg 85mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	d1 d1 d1 d1(46h)	14TD	CVポートのみ
大腸癌	1-030-0/1 22-0	パニツムマブ(ベクティビックス単剤療法)	パニツムマブ(Pmab)	6mg/kg	d1	14TD	
大腸癌	1-030-0/1 23-0	CPT-11(150)+Pmab(6)	パニツムマブ(Pmab) イリノテカン(CPT-11)	6mg/kg 150mg/m ²	d1 d1	14TD	
大腸癌	1-030-0/1 24-0	UFT+LV+BV(5)	ベバシズマブ(BV) UFT	5mg/kg 300-600mg	d1,15 d1-21	28TD	UFT+LV 7日間休薬
大腸癌	1-030-1 25-0	sLV5FU2	5-FU 5-FU	400mg/m ² 2400mg/m ²	d1 d1(46h)	14TD	CVポートのみ
大腸癌	1-030-1 26-0	sLV5FU2+BV(5)	ベバシズマブ(BV) 5-FU 5-FU	5mg/kg 400mg/m ² 2400mg/m ²	d1 d1 d1(46h)	14TD	CVポートのみ
大腸癌	1-030-0/1 27-0	S-1+BV	ベバシズマブ(BV) S-1	7.5mg/kg 80-120mg	d1 d1-14	21TD	
大腸癌	1-030-1 28-0	FOLFIRI+Cmab(500mg/m ²) 隔週	セツキシマブ(Cmab) イリノテカン(CPT-11) 5-FU 5-FU	500mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	d1 d1 d1 d1(46h)	14TD	CVポートのみ
大腸癌	1-030-0/1 30-0	Cmab(500)+CPT-11(150) 隔週	セツキシマブ(Cmab) イリノテカン(CPT-11)	500mg/m ² 150mg/m ²	d1 d1	14TD	
大腸癌	1-030-0/1 31-0	SOX (S-1+L-OHP(100))	オキサリプラチン(L-OHP) S-1	130mg/m ² 80-120mg	d1 d1-14		
大腸癌	1-030-0/1 32-0	ロンサーフ+BV (TAS102+BV(7.5))	ベバシズマブ(BV) ロンサーフ(TAS102)	5mg/kg 35mg/m ² /回	d1,15 —	28TD	ロンサーフ:5日服用2日間休薬×2 その後14日間休薬
がん種	レジメンコード	レジメン名称	一般名(一部商品名)	用量	投与日	1コース期間	備考
膵癌	1-040-1 00-0	mFOLFIRINOX	オキサリプラチン(L-OHP) イリノテカン(CPT-11) 5-FU	85mg/m ² 150mg/m ² 2400mg/m ²	d1 d1 d1(46h)	14TD	CVポートのみ IRI150mg/m ² 、ポースなし
膵癌	1-040-1 01-0	FOLFIRINOX	オキサリプラチン(L-OHP) イリノテカン(CPT-11) 5-FU 5-FU	85mg/m ² 180mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	d1 d1 d1 d1(46h)	14TD	CVポートのみ
膵癌	1-040-0/1 02-0	GEM(1000) (3投1休)	ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m ²	d1,8,15	28TD	
膵癌	1-040-0/1 03-0	GEM(1000) (隔週)	ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m ²	d1	14TD	

膵癌	1-040-0/1 04-0	GEM(1000)+nab-PTX(125) (3投1休)	ゲムシタビン(GEM) アブラキサン(nab-PTX)	1000mg/m ² 125mg/m ²	d1,8,15 d1,8,15	28TD	
膵癌	1-040-0/1 05-0	S-1(60)+GEM(1000) (GS療法)	ゲムシタビン(GEM) S-1	1000mg/m ² 80-120mg	d1,8 d1-14	21TD	
膵癌	1-040-0/1 06-0	GEM(1000) (2投1休)	ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m ²	d1,8	21TD	
膵癌	1-040-1 07-0	オニバイド+5-FU療法	リポソーム化イリノテカン 5-FU	70mg/m ² 2400mg/m ²	d1 d1(46h)	14TD	CVポートのみ オニバイド終了後レボホリナート開始
がん種	レジメンコード	レジメン名称	一般名(一部商品名)	用量	投与日	1コース期間	備考
胆道癌	1-050-0/1 01-0	GEM(1000) (3投1休)	ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m ²	d1,8,15	28TD	
胆道癌	1-050-0/1 02-0	GEM(1000) (隔週)	ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m ²	d1	14TD	
胆道癌	1-050-0/1 03-0	GEM(1000)+CDDP(25)	シスプラチン(CDDP) ゲムシタビン(GEM)	25mg/m ² 1000mg/m ²	d1,8 d1,8	21TD	
胆道癌	1-050-0/1 04-0	S-1(60)+GEM(1000) (GS療法)	ゲムシタビン(GEM) S-1	1000mg/m ² 80-120mg	d1,8 d1-14	21TD	
胆道癌	1-050-0/1 05-0	GEM(1000) (2投1休)	ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m ²	d1,8	21TD	
がん種	レジメンコード	レジメン名称	一般名(一部商品名)	用量	投与日	1コース期間	備考
肝癌	1-060-1 01-0	ソラフェニブ+Low-DoseFP動注療法	アイエーコール(CDDP) 5-FU	20mg/m ² 1650mg/m ²	d1,8 d1,8	28TD	CVポートのみ 5-FU 5TD持続動注(330mg/m ² /day)
肝癌	1-060-0/1 02-0	ラムシルマブ(8mg/kg) 単独療法	ラムシルマブ(RAM)	8mg/kg	d1	14TD	
がん種	レジメンコード	レジメン名称	一般名(一部商品名)	用量	投与日	1コース期間	備考
神経内分泌癌	1-070-0/1 01-0	CDDP(60)+CPT-11(60) short	シスプラチン(CDDP) イリノテカン(CPT-11)	60mg/m ² 60mg/m ²	d1 d1,8,15	28TD	
神経内分泌癌	1-070-0/1 02-0	CDDP(30)+CPT-11(60) bi-weekly	シスプラチン(CDDP) イリノテカン(CPT-11)	30mg/m ² 60mg/m ²	d1 d1	14TD	
がん種	レジメンコード	レジメン名称	一般名(一部商品名)	用量	投与日	1コース期間	備考
乳癌	1-080-0/1 01-0	EPI(100)+CPA(500)+5-FU(500) (FEC療法)	エピルビシン(EPI) シクロホスファミド(CPA) 5-FU	100mg/m ² 500mg/m ² 500mg/m ²	d1 d1 d1	21TD	
乳癌	1-080-0/1 02-0	【EPI 75】 EPI(75)+CPA(600) (EC療法)	エピルビシン(EPI) シクロホスファミド(CPA)	75mg/m ² 600mg/m ²	d1 d1	21TD	
乳癌	1-080-0/1 03-0	【EPI 90】 EPI(90)+CPA(600) (EC療法)	エピルビシン(EPI) シクロホスファミド(CPA)	90mg/m ² 600mg/m ²	d1 d1	21TD	
乳癌	1-080-0/1 04-0	GEM(1250) (2投1休)	ゲムシタビン(GEM)	1250mg/m ²	d1,8	21TD	
乳癌	1-080-0/1 05-0	【初回】HER(8mg/kg) (3週毎)	トラスツズマブ(HER)	8mg/kg	d1	21TD	他レジメンと組み合わせ可能
乳癌	1-080-0/1 06-0	【2回目以降】HER(6mg/kg) (3週毎)	トラスツズマブ(HER)	6mg/kg	d1	21TD	他レジメンと組み合わせ可能
乳癌	1-080-0/1 07-0	【初回】HER(4mg/kg) (毎週)	トラスツズマブ(HER)	4mg/kg	d1	7TD	他レジメンと組み合わせ可能

乳癌	1-080-0/1 08-0	【2回目以降】HER(2mg/kg) (毎週)	トラスツズマブ (HER)	2mg/kg	d1	7TD	他レジメンと組み合わせ可能
乳癌	1-080-0/1 09-0	nab-PTX(260) (tri-weekly)	アブラキサン (nab-PTX)	260mg/m ²	d1	21TD	
乳癌	1-080-0/1 10-0	PTX(80) weekly(3投1休)	パクリタキセル (PTX)	80mg/m ²	d1,8,15	28TD	
乳癌	1-080-0/1 11-0	【初回】S-1+HER(8)	トラスツズマブ (HER) S-1	8mg/kg 80-120mg	d1 d1-14	21TD	
乳癌	1-080-0/1 12-0	【2回目以降】S-1+HER(6)	トラスツズマブ (HER) S-1	6mg/kg 80-120mg	d1 d1-14	21TD	
乳癌	1-080-0/1 13-0	VNR(25) (2投1休)	ビノレルビン (VNR)	25mg/m ²	d1,8	21TD	
乳癌	1-080-0/1 14-0	【初回】ペルツズマブ(840mg)+HER(8)+DTX(60)	ペルツズマブ トラスツズマブ (HER) ドセタキセル (DTX)	840mg 8mg/kg 60mg/m ²	d1 d1 d1	21TD	
乳癌	1-080-0/1 15-0	【2回目以降】ペルツズマブ(420mg)+HER(6)+DTX(60)	ペルツズマブ トラスツズマブ (HER) ドセタキセル (DTX)	420mg 6mg/kg 60mg/m ²	d1 d1 d1	21TD	
乳癌	1-080-0/1 16-0	DTX(75)+CPA(600) (TC療法)	ドセタキセル (DTX) シクロホスファミド (CPA)	75mg/m ² 600mg/m ²	d1 d1	21TD	
乳癌	1-080-0/1 17-0	エリブリン(1.4)療法	エリブリン (ハラヴェン)	1.4mg/m ²	d1,8	21TD	
乳癌	1-080-0/1 18-0	カドサイラ(3.6mg/kg)療法	トラスツズマブ・エムタンシン (T-DM1)	3.6mg/kg	d1	21TD	
乳癌	1-080-0/1 19-0	【初回】PTX(90)+BV(10mg/kg)	ペバシズマブ (BV) パクリタキセル (PTX)	10mg/kg 90mg/m ²	d1,15 d1,8,15	28TD	
乳癌	1-080-0/1 20-0	【2回目以降】PTX(90)+BV(10mg/kg)	ペバシズマブ (BV) パクリタキセル (PTX)	10mg/kg 90mg/m ²	d1,15 d1,8,15	28TD	
乳癌	1-080-0/1 21-0	PTX(80) weekly(12週連続)	パクリタキセル (PTX)	80mg/m ²	d1	7TD	12コース連続投与
乳癌	1-080-0/1 22-0	DTX(60) (tri-weekly)	ドセタキセル (DTX)	60mg/m ²	d1	21TD	
乳癌	1-080-0/1 23-0	DTX(75) (tri-weekly)	ドセタキセル (DTX)	75mg/m ²	d1	21TD	
乳癌	1-080-0/1 24-0	ddEC療法 【EPI 90】	エピルビシン (EPI) シクロホスファミド (CPA)	90mg/m ² 600mg/m ²	d1 d1	14TD	ジールスタ投与
乳癌	1-080-0/1 25-0	【初回】ペルツズマブ(840mg)+HER(8)	ペルツズマブ トラスツズマブ (HER)	840mg 8mg/kg	d1 d1	21TD	他レジメンと組み合わせ可能
乳癌	1-080-0/1 26-0	【2回目以降】ペルツズマブ(420mg)+HER(6)	ペルツズマブ トラスツズマブ (HER)	420mg 6mg/kg	d1 d1	21TD	他レジメンと組み合わせ可能
乳癌	1-080-0/1 27-0	Atezolizumab+nab-PTX(100)	アテゾリズマブ (テセントリク) アブラキサン (nab-PTX)	840mg 100mg/m ²	d1,15 d1,8,15	28TD	

がん種	レジメンコード	レジメン名称	一般名（一部商品名）	用量	投与日	1コース期間	備考
肺癌(NSCLC) 【CBDCA】	1-090-0/1 01-0	【初回】CBDCA(2)+PTX(40)+RT	カルボプラチン(CBDCA) パクリタキセル(PTX)	AUC2 40mg/m ²	d1 d1	7TD	初回:前投薬DEX20mg
肺癌(NSCLC) 【CBDCA】	1-090-0/1 02-0	【2回目以降】CBDCA(2)+PTX(40)+RT	カルボプラチン(CBDCA) パクリタキセル(PTX)	AUC2 40mg/m ²	d1 d1	7TD	2回目以降:前投薬DEX10mg
肺癌(NSCLC) 【CBDCA】	1-090-0/1 03-0	CBDCA(5)+PEM(500)	カルボプラチン(CBDCA) ペメトレキセド(PEM)	AUC5 500mg/m ²	d1 d1	21TD	
肺癌(NSCLC) 【CBDCA】	1-090-0/1 04-0	CBDCA(5)+PEM(500)+BZ(15)	カルボプラチン(CBDCA) ペメトレキセド(PEM) ベバシズマブ(BV)	AUC5 500mg/m ² 15mg/kg	d1 d1 d1	21TD	
肺癌(NSCLC) 【CBDCA】	1-090-0/1 06-0	CBDCA(6)+PTX(200)	カルボプラチン(CBDCA) パクリタキセル(PTX)	AUC6 200mg/m ²	d1 d1	21TD	
肺癌(NSCLC) 【CBDCA】	1-090-0/1 08-0	CBDCA(6)+weekly nab-PTX(100)	カルボプラチン(CBDCA) アブラキササン(nab-PTX)	AUC6 100mg/m ²	d1 d1,8,15	21TD	
肺癌(NSCLC) 【CBDCA】	1-090-0/1 12-0	CBDCA(5)+PEM(500)+Pembrolizumab	カルボプラチン(CBDCA) ペメトレキセド(PEM) ペムブロリズマブ(キイトルーダ)	AUC5 500mg/m ² 200mg	d1 d1 d1	21TD	
肺癌(NSCLC) 【CBDCA】	1-090-0/1 14-0	CBDCA(6)+weekly nab-PTX(100)+Pembrolizumab	カルボプラチン(CBDCA) アブラキササン(nab-PTX) ペムブロリズマブ(キイトルーダ)	AUC6 100mg/m ² 200mg	d1 d1,8,15 d1	21TD	
肺癌(NSCLC) 【CBDCA】	1-090-0/1 14-0	CBDCA(6)+PTX(200)+BZ(15)+Atezolizumab	カルボプラチン(CBDCA) パクリタキセル(PTX) ベバシズマブ(BV) アテゾリズマブ(テセントリク)	AUC6 200mg/m ² 15mg/kg 1200mg	d1 d1 d1 d1	21TD	
がん種	レジメンコード	レジメン名称	一般名（一部商品名）	用量	投与日	1コース期間	備考
肺癌(NSCLC) 【CDDP】	1-091-0/1 02-0	CDDP(75)+PEM(500)	シスプラチン(CDDP) ペメトレキセド(PEM)	75mg/m ² 500mg/m ²	d1 d1	21TD	DAY0よりハイドレーション 腹膜癌にも使用
肺癌(NSCLC) 【CDDP】	1-091-0/1 04-0	CDDP(75)+PEM(500) Short	シスプラチン(CDDP) ペメトレキセド(PEM)	75mg/m ² 500mg/m ²	d1 d1	21TD	ショートハイドレーション
肺癌(NSCLC) 【CDDP】	1-091-0/1 05-0	CDDP(80)+CPT-11(60)	シスプラチン(CDDP) イリノテカン(CPT-11)	80mg/m ² 60mg/m ²	d1 d1,8,15	28TD	DAY0よりハイドレーション
肺癌(NSCLC) 【CDDP】	1-091-0/1 08-0	CDDP(80)+VNR(20)+RT	シスプラチン(CDDP) ビノレルビン(VNR)	80mg/m ² 20mg/m ²	d1 d1,8	28TD	
肺癌(NSCLC) 【CDDP】	1-091-0/1 09-0	CDDP(80)+VNR(25) Short	シスプラチン(CDDP) ビノレルビン(VNR)	80mg/m ² 25mg/m ²	d1 d1,8	21TD	ショートハイドレーション
肺癌(NSCLC) 【CDDP】	1-091-0/1 10-0	CDDP(75)+PEM(500)+BZ(15) Short	シスプラチン(CDDP) ペメトレキセド(PEM) ベバシズマブ(BV)	75mg/m ² 500mg/m ² 15mg/kg	d1 d1 d1	21TD	ショートハイドレーション
肺癌(NSCLC) 【CDDP】	1-091-0/1 11-0	CDDP(80)+VNR(20) Short	シスプラチン(CDDP) ビノレルビン(VNR)	80mg/m ² 20mg/m ²	d1 d1,8	21TD	ショートハイドレーション
肺癌(NSCLC) 【CDDP】	1-091-0/1 12-0	CDDP(80)+GEM(1000) Short	シスプラチン(CDDP) ゲムシタビン(GEM)	80mg/m ² 1000mg/m ²	d1 d1,8	21TD	ショートハイドレーション
肺癌(NSCLC) 【CDDP】	1-091-0/1 14-0	CDDP(75)+PEM(500)+Pembrolizumab Short	シスプラチン(CDDP) ペメトレキセド(PEM) ペムブロリズマブ(キイトルーダ)	75mg/m ² 500mg/m ² 200mg	d1 d1 d1	21TD	ショートハイドレーション

がん種	レジメンコード	レジメン名称	一般名(一部商品名)	用量	投与日	1コース期間	備考
肺癌(NSCLC) 【その他】	1-092-0/1 01-0	Bevacizumab(15mg/kg)	ベバシズマブ(BV)	15mg/kg	d1	21TD	
肺癌(NSCLC) 【その他】	1-092-0/1 02-0	Docetaxel(60)	ドセタキセル(DTX)	60mg/m ²	d1	21TD	
肺癌(NSCLC) 【その他】	1-092-0/1 03-0	GEM(1000)	ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m ²	d1,8	21TD	
肺癌(NSCLC) 【その他】	1-092-0/1 04-0	PEM(500)	ペムトレキセド(PEM)	500mg/m ²	d1	21TD	
肺癌(NSCLC) 【その他】	1-092-0/1 05-0	PEM(500)+BZ(7.5)	ペムトレキセド(PEM) ベバシズマブ(BV)	500mg/m ² 15mg/kg	d1 d1	21TD	
肺癌(NSCLC) 【その他】	1-092-0/1 06-0	VNR(25)	ビノレルビン(VNR)	25mg/m ²	d1,8	21TD	
肺癌(NSCLC) 【その他】	1-092-0/1 07-0	Nivolumab(240mg/body) (オプジーボ療法)	ニボルマブ	240mg	d1	14TD	
肺癌(NSCLC) 【その他】	1-092-0/1 08-0	サイラムザ(10)+DOC(60)	ラムシルマブ(RAM) ドセタキセル(DTX)	10mg/kg 60mg/m ²	d1 d1	21TD	
肺癌(NSCLC) 【その他】	1-092-0/1 09-0	エルロチニブ(タルセバ)+BV(15mg/kg)	ベバシズマブ(BV)	15mg/kg	d1	21TD	
肺癌(NSCLC) 【その他】	1-092-0/1 10-0	Pembrolizumab 200mg/body	ペムブロリズマブ(キイトルーダ)	200mg	d1	21TD	
肺癌(NSCLC) 【その他】	1-092-0/1 11-0	Atezolizumab療法	アテゾリズマブ(テセントリク)	1200mg	d1	21TD	
肺癌(NSCLC) 【その他】	1-092-0/1 12-0	Durvalumab療法	デュルバルマブ(イミフィンジ)	10mg/kg	d1	14TD	
肺癌(NSCLC) 【その他】	1-092-0/1 13-0	PEM(500)+Pembrolizumab	ペムトレキセド(PEM) ペムブロリズマブ(キイトルーダ)	500mg/m ² 200mg	d1 d1	21TD	
肺癌(NSCLC) 【その他】	1-092-0/1 14-0	BV(15mg/kg)+Atezolizumab	ベバシズマブ(BV) アテゾリズマブ(テセントリク)	15mg/kg 1200mg	d1 d1	21TD	
がん種	レジメンコード	レジメン名称	一般名(一部商品名)	用量	投与日	1コース期間	備考
肺癌(SCLC)	1-100-0/1 01-0	AMR(40) 3週毎	アムルピシン(AMR)	40mg/m ²	d1,2,3	21TD	2nd line
肺癌(SCLC)	1-100-0/1 02-0	AMR(35) 3週毎	アムルピシン(AMR)	35mg/m ²	d1,2,3	21TD	3rd line以降
肺癌(SCLC)	1-100-0/1 03-0	CBDCA(5)+CPT-11(60)	カルボプラチン(CBDCA) イリノテカン(CPT-11)	AUC5 60mg/m ²	d1 d1,8,15	28TD	
肺癌(SCLC)	1-100-0/1 04-0	CBDCA(5)+ETOP(80)	カルボプラチン(CBDCA) エトポシド(ETOP)	AUC5 80mg/m ²	d1 d1,2,3	21TD	
肺癌(SCLC)	1-100-0/1 05-0	CDDP(60)+CPT-11(60)	シスプラチン(CDDP) イリノテカン(CPT-11)	60mg/m ² 60mg/m ²	d1 d1,8,15	28TD	DAY0よりハイドレーション
肺癌(SCLC)	1-100-0/1 06-0	CDDP(80)+ETOP(100)+RT q4w	シスプラチン(CDDP) エトポシド(ETOP)	80mg/m ² 100mg/m ²	d1 d1,2,3	28TD	DAY0よりハイドレーション
肺癌(SCLC)	1-100-0/1 07-0	CDDP(80)+ETOP(100) q3w	シスプラチン(CDDP) エトポシド(ETOP)	80mg/m ² 100mg/m ²	d1 d1,2,3	21TD	DAY0よりハイドレーション
肺癌(SCLC)	1-100-0/1 08-0	CPT-11(100)	イリノテカン(CPT-11)	100mg/m ²	d1,8,15	28TD	

肺癌 (SCLC)	1-100-0/1 09-0	NGT(1.0) 3週毎	ノギテカン (NGT)	1mg/㎡	d1,2,3,4,5	21TD	
肺癌 (SCLC)	1-100-0/1 10-0	CDDP(60)+CPT-11(60) Short	シスプラチン (CDDP) イリノテカン (CPT-11)	60mg/㎡ 60mg/㎡	d1 d1,8,15	28TD	ショートハイドレーション
肺癌 (SCLC)	1-100-0/1 11-0	CDDP(80)+ETOP(100) q3w Short	シスプラチン (CDDP) エトポシド (ETOP)	80mg/㎡ 100mg/㎡	d1 d1,2,3	21TD	ショートハイドレーション
肺癌 (SCLC)	1-100-0/1 12-0	AMR(40) 4週毎	アムルピシン (AMR)	40mg/㎡	d1,2,3	28TD	
肺癌 (SCLC)	1-100-0/1 13-0	AMR(35) 4週毎	アムルピシン (AMR)	35mg/㎡	d1,2,3	28TD	
肺癌 (SCLC)	1-100-0/1 14-0	NGT(1.0) 4週毎	ノギテカン (NGT)	1mg/㎡	d1,2,3,4,5	28TD	
肺癌 (SCLC)	1-100-0/1 15-0	CDDP(80)+ETOP(100)+RT q4w Short	シスプラチン (CDDP) エトポシド (ETOP)	80mg/㎡ 100mg/㎡	d1 d1,2,3	28TD	ショートハイドレーション
肺癌 (SCLC)	1-100-0/1 16-0	CBDCA(5)+ETOP(80)+Atezolizumab	カルボプラチン (CBDCA) エトポシド (ETOP) アテゾリズマブ (テセントリク)	AUC5 80mg/㎡ 1200mg	d1 d1,2,3 d1	21TD	
肺癌 (SCLC)	1-100-0/1 17-0	Atezolizumab療法	アテゾリズマブ (テセントリク)	1200mg	d1	21TD	
がん種	レジメンコード	レジメン名称	一般名 (一部商品名)	用量	投与日	1コース期間	備考
呼吸器 (ADOC)	1-110-0/1 01-0	ADR(40)+CDDP(50)+VCR(0.6)+CPA(700)	ドキシソルピシン (アドリアシン、ADR) シスプラチン (CDDP) ビンクリスチン (VCR) シクロホスファミド (CPA)	40mg/㎡ 50mg/㎡ 0.6mg/㎡ 700mg/㎡	d1 d1 d3 d4	21TD	
がん種	レジメンコード	レジメン名称	一般名 (一部商品名)	用量	投与日	1コース期間	備考
尿路上皮癌	1-120-0/1 01-0	GC療法 (GEM(1000)+CDDP(70))	シスプラチン (CDDP) ゲムシタビン (GEM)	70mg/㎡ 1000mg/㎡	d2 d1,8,15	28TD	
尿路上皮癌	1-120-0/1 02-0	GEM(1000)	ゲムシタビン (GEM)	1000mg/㎡	d1,8,15	28TD	
尿路上皮癌	1-120-0/1 03-0	TIN療法 (PTX(175)+IFM(1500)+CDGP(70))	パクリタキセル (PTX) イホスファミド (IFM) ネダプラチン (CDGP)	175mg/㎡ 1500mg/㎡ 70mg/㎡	d1 d1,2,3 d1	28TD	DAY0よりハイドレーション ウロミテキサン300mg/㎡
尿路上皮癌	1-120-0/1 04-0	GEM(1000)+CBDCA (AUC5)	カルボプラチン (CBDCA) ゲムシタビン (GEM)	AUC5 1000mg/㎡	d1 d1,8,15	28TD	
尿路上皮癌	1-120-0/1 05-0	Pembrolizumab 200mg/body	ペムブロリズマブ (キイトルーダ)	200mg	d1	21TD	
がん種	レジメンコード	レジメン名称	一般名 (一部商品名)	用量	投与日	1コース期間	備考
前立腺癌	1-130-0/1 01-0	ドセタキセル(70)	ドセタキセル (DTX)	70mg/㎡	d1	28TD	
前立腺癌	1-130-0/1 02-0	カバジタキセル(25)療法	カバジタキセル (ジェブタナ)	25mg/㎡	d1	21TD	

がん種	レジメンコード	レジメン名称	一般名(一部商品名)	用量	投与日	1コース期間	備考
泌尿器癌 (精巣腫瘍)	1-140-0/1 01-0	BEP療法 (CDDP(20)+VP-16(100)+BLM(30))	シスプラチン(CDDP) エトポシド(VP-16) ブレオマイシン(BLM)	20mg/m ² 100mg/m ² 30mg	d1,2,3,4,5 d1,2,3,4,5 d1,8,15	21TD	DAY0よりハイドレーション
泌尿器癌 (腎癌)	1-140-0/1 02-0	テムシロリムス(25)療法	テムシロリムス(トーリセル)	25mg	d1	7TD	
泌尿器癌 (腎癌)	1-140-0/1 03-0	Nivolumab(240mg/body) (オプジーボ療法)	ニボルマブ	240mg	d1	14TD	
泌尿器癌 (腎癌)	1-140-0/1 04-0	Nivolumab(240mg/body)+Ipilimumab(1mg/kg)	ニボルマブ(オプジーボ) イピリムマブ(ヤーボイ)	240mg 1mg/kg	d1 d1	21TD	
泌尿器癌 (腎癌)	1-140-0/1 05-0	Avelumab(バベンチオ)+アキシチニブ療法	アベルマブ(バベンチオ) アキシチニブ(インライタ)	10mg/kg 10mg/day	d1 連日	14TD	
泌尿器癌 (腎癌)	1-140-0/1 06-0	Pembrolizumab 200mg/body+アキシチニブ療法	ペムブロリズマブ(キイトルーダ) アキシチニブ(インライタ)	200mg 10mg/day	d1 連日	21TD	
がん種	レジメンコード	レジメン名称	一般名(一部商品名)	用量	投与日	1コース期間	備考
婦人科癌	1-150-0/1 01-0	TC療法 (CBDCA(5)+PTX(175))	カルボプラチン(CBDCA) パクリタキセル(PTX)	AUC5 175mg/m ²	d1 d1	21TD	
婦人科癌	1-150-0/1 02-0	DC療法 (CBDCA(5)+DTX(70))	カルボプラチン(CBDCA) ドセタキセル(DTX)	AUC5 70mg/m ²	d1 d1	21TD	
婦人科癌	1-150-0/1 03-0	CDGP(25~30)週1回単独療法	ネダプラチン(CDGP)	25mg/m ²	d1	7TD	
婦人科癌	1-150-0/1 04-0	ピラルピシン(THP)単独療法	ピラルピシン(ピノルビン、THP)	60mg	d1	28TD	
婦人科癌	1-150-0/1 05-0	GEM単独療法	ゲムシタピン(GEM)	1000mg/m ²	d1,8,15	28TD	
婦人科癌	1-150-0/1 06-0	DXR(ドキシル)療法	リポソーマルドキシソルピシン(ドキシル、DXR)	50mg/m ²	d1	28TD	
婦人科癌	1-150-0/1 07-0	DC療法+BV (CBDCA(5)+DTX(70)+BV(15))	カルボプラチン(CBDCA) ドセタキセル(DTX) ベバシズマブ(BV)	AUC5 70mg/m ² 15mg/kg	d1 d1 d1	21TD	
婦人科癌	1-150-0/1 08-0	TN療法 (CDGP(80)+PTX(175))	ネダプラチン(CDGP) パクリタキセル(PTX)	25mg/m ² 175mg/m ²	d1 d1	21TD	
婦人科癌	1-150-0/1 09-0	DG療法 (GEM(900)+DTX(100))	ゲムシタピン(GEM) ドセタキセル(DTX)	900mg/m ² 100mg/m ²	d1,8 d8	21TD	
婦人科癌	1-150-0/1 10-0	CPT-11(bi-weekly)	イリノテカン(CPT-11)	150mg/m ²	d1,15,29	49TD	
婦人科癌	1-150-0/1 11-0	AP療法 (ADR(60)+CDDP(50))	ドキシソルピシン(アドリアシン、ADR) シスプラチン(CDDP)	60mg/m ² 50mg/m ²	d1 d1	21TD	DAY0よりハイドレーション
婦人科癌	1-150-0/1 12-0	Pembrolizumab 200mg/body	ペムブロリズマブ(キイトルーダ)	200mg	d1	21TD	
婦人科癌	1-150-0/1 13-0	TC療法+BV (CBDCA(5)+PTX(175)+BV(15))	カルボプラチン(CBDCA) パクリタキセル(PTX) ベバシズマブ(BV)	AUC5 175mg/m ² 15mg/kg	d1 d1 d1	21TD	
婦人科癌	1-150-0/1 14-0	VAC療法 (ACT-D+VCR+CPA)	アクチノマイシンD(ACT-D) ビンクリスチン(VCR) シクロホスファミド(CPA)	0.5mg/body 1mg/m ² 150mg/m ²	d1-5 d1-5 d1	28TD	
婦人科癌	1-150-0/1 15-0	weeklyTN療法 (CDGP(80)+PTX(175))	ネダプラチン(CDGP) パクリタキセル(PTX)	17mg/m ² 60mg/m ²	d1,8,15 d1,8,15	28TD	

がん種	レジメンコード	レジメン名称	一般名（一部商品名）	用量	投与日	1コース期間	備考
悪性リンパ腫	1-160-0/1 01-0	CHOP(ADR/DXR+VCR+CPA)	ドキシソルピシン(アドリアシン、ADR) ビンクリスチン(VCR) シクロホスファミド(CPA)	50mg/m ² 1.4mg/m ² 750mg/m ²	d1 d1 d1	21TD	
悪性リンパ腫	1-160-0/1 01-0	R-CHOP(リツキシマブ+ADR+VCR+CPA)	リツキシマブ(リツキサ) ドキシソルピシン(アドリアシン、ADR) ビンクリスチン(VCR) シクロホスファミド(CPA)	375mg/m ² 60mg/m ² 1.4mg/m ² 750mg/m ²	d1 d2 d2 d2	21TD	
がん種	レジメンコード	レジメン名称	一般名（一部商品名）	用量	投与日	1コース期間	備考
悪性神経膠腫	1-170-0/1 01-0	【初回】ベバシズマブ療法(10)隔週	ベバシズマブ(BV)	10mg/kg	d1	14TD	初回90分
悪性神経膠腫	1-170-0/1 02-0	【2回目】ベバシズマブ療法(10)隔週	ベバシズマブ(BV)	10mg/kg	d1	14TD	2回目60分
悪性神経膠腫	1-170-0/1 03-0	【3回目以降】ベバシズマブ療法(10)隔週	ベバシズマブ(BV)	10mg/kg	d1	14TD	3回目以降30分
悪性神経膠腫	1-170-0/1 04-0	【初回】ベバシズマブ療法(15)1投2休	ベバシズマブ(BV)	15mg/kg	d1	21TD	初回90分
悪性神経膠腫	1-170-0/1 05-0	【2回目】ベバシズマブ療法(15)1投2休	ベバシズマブ(BV)	15mg/kg	d1	21TD	2回目60分
悪性神経膠腫	1-170-0/1 06-0	【3回目以降】ベバシズマブ療法(15)1投2休	ベバシズマブ(BV)	15mg/kg	d1	21TD	3回目以降30分

その他レジメンオーダーに登録していないもの

- 各種ホルモン剤
- アイエーコール(肝動注)
- ファルモルピシン(肝動注)
- マイトマイシン(眼科)
- アドリアマイシン(腹腔内注入)
- ピノルビン(膀胱内注入)
- ベルケイド
- 未使用レジメン11種